

ANNATA 2009

GERMOGLIAMENTO	2 APRILE
FIORITURA	22 MAGGIO
ALLEGAGIONE	1 GIUGNO
INVAIATURA	10 AGOSTO
EPOCA DI RACCOLTA	dal 9 SETTEMBRE

L'andamento stagionale del 2009 è stato caratterizzato da un periodo autunno – invernale piuttosto rigido e da abbondanti precipitazioni che sono andate a ricostituire le riserve idriche che negli anni precedenti erano state depauperate. Grazie a ciò, e ad una temperatura media di Marzo leggermente più alta della media degli ultimi 16 anni si è avuto un germogliamento anticipato di circa 7 giorni rispetto all'anno precedente, sviluppo vegetativo, che è proseguito repentinamente anche nei mesi di aprile e maggio, tanto da arrivare ad una fioritura molto anticipata rispetto alle annate precedenti. La stagione è proseguita all'insegna del caldo e del bel tempo, ad eccezione della prima decade di Luglio dove si sono concentrate abbondanti precipitazioni anche con fenomeni grandinigeni che non ha però prodotto alcun danno rilevante. Da ricordare invece un mese di agosto torrido paragonabile solamente a quello dell'annata 2003. Nel mese di settembre si sono registrate delle ottime escursioni termiche fra il giorno e la notte, garantendo un adeguato accumulo di metaboliti secondari necessari all'innalzamento della qualità finale dell'uva, ma soprattutto un periodo vendemmiale ottimo data la scarsità delle precipitazioni. L'annata 2009, dunque, sarà ricordata per produzioni di quantità ridotta rispetto all'anno precedente, dato l'anticipo stagionale e lo stress idrico che ha accompagnato tutto l'anno, con uno stato sanitario e una qualità ottima. Annata quindi da ricordare come una tra le migliori del decennio.